

Streszczenie

Seksualność jest integralną płaszczyzną funkcjonowania ludzkiego, a możliwość realizacji potrzeb seksualnych w zgodzie z osobistymi pragnieniami (przy poszanowaniu praw innych osób) stanowi jedno z podstawowych praw każdego człowieka.

Zaburzenia psychiczne, wywołujące zmiany we wszystkich płaszczyznach życia wpływają w sposób znaczący również na ten aspekt życia

Cel niniejszej pracy obejmuje scharakteryzowanie modelu funkcjonowania seksualnego pacjentów z zaburzeniami nastroju oraz zweryfikowanie roli współwystępujących zaburzeń osobowości.

W badaniu wzięło udział 100 pacjentów mazowieckich szpitali psychiatrycznych (55 kobiet i 45 mężczyzn) w trakcie hospitalizacji leczących epizod depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (39 osób), depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (34 osoby) oraz epizodu manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej (27 osób). Zastosowano następujące metody diagnostyczne: *Kwestionariusz zaburzeń osobowości z Osi II DSM-IV SCID-II*, skalę oceny potrzeb seksualnych Mell-Krat, *Indeks Funkcji Seksualnych Kobiet (FSFI)*, *Międzynarodowy Indeks Funkcji Seksualnych Mężczyzn – wersja skrócona (IIEF-5)* oraz dwie autorskie pozycje: *Kwestionariusz Zaburzeń Seksualnych (KZS)* i *Kwestionariusz Własnej Seksualności (KWS)*.

Wyniki wykazały silny związek pomiędzy występowaniem zaburzeń afektywnych, a nasileniem dysfunkcji seksualnych bez względu na rodzaj epizodu chorobowego. Leczenie farmakologiczne nie pogłębia poziomu deficytów w zakresie funkcjonowania seksualnego występujących w przebiegu zaburzeń nastroju.

Ponadto, wskazano na większe trudności w zakresie funkcjonowania seksualnego w trakcie choroby oraz leczenia farmakologicznego u osób ze współwystępującymi zaburzeniami osobowości.